

部の概要

臨床研究部は、健康診断と成人健康調査（AHS）や被爆二世（被爆者の子ども）臨床調査（FOCS）などの調査を実施している。AHSは、1)臨床追跡調査に基づき多因子疾患の発症についてモニターすること、2)放射線被曝に関連する疾患を特定すること、3)放影研の他の研究部および所外の研究者と協力し疾患のリスク増加の原因となる機序の検討を進めることを目的とする。FOCSは、1)臨床追跡調査に基づき放射線被曝による遺伝的影響を究明すること、2)疫学部、統計部および分子生物学部と共に影響や原因機序を明らかにすべく学際的な研究を促進することを目的とする。これらの調査によって、種々の健康転帰について調べ、機序を解明するために、多くの特定の調査を放影研内ならびに外部研究者との共同研究により行う機会が提供されている。

2年に1度のAHS健診は1958年に開始され、現在に至っている。AHS集団は寿命調査（LSS）集団の副次集団であり、この集団は、胎内被爆者を含むあらゆる被爆時年齢の原爆被爆者で構成される。AHS健診は被爆者との唯一の定期的かつ直接的な接点であり、疾患の早期発見により被爆者の健康維持に役立っている。健診を通じて提供された試料によって、放影研の様々な研究部や外部研究者らによる多様かつ貴重な特別研究が可能となっている。新たに取得したインフォームドコンセントに基づき、1969年から血清が、1990年から血液細胞と血漿が、また1999年からは尿がAHS対象者から長期にわたり収集され保存されている。AHSは、1)非がん疾患の放射線リスクを評価する、2)生理学的または生化学的な異常における放射線の影響を究明し、この情報と生活上の他の事象（生活習慣）および疾患の病態や形態との関連性を究明する、また、3)健診を通じて得られた保存試料ならびに臨床的、生理学的および疫学的情報を用いて、がんおよび非がん疾患における放射線の影響の機序を解明する、という放影研の使命に大きく貢献している。

現在までに29周期行われた2年に1度の健診から得られた膨大な臨床・疫学データが蓄積された結果、AHSの重要性はますます増大している。心血管疾患、副甲状腺機能亢進症、甲状腺疾患、慢性B型肝炎ウイルス感染、白内障などに加え、炎症やインスリン抵抗性などの不顕性のリスク指標や状態など、非がん疾患の罹患率における低線量から中等度の放射線量に関連した増加について解析するための最も有力なデータがAHSによって提供されている。

臨床研究部は2002年にFOCSを開始した。FOCSでは、2002年から2006年にかけて約12,000人を対象として健診を実施し、得られた有病率データに基づき多遺伝子・多因子疾患（糖尿病、高血圧、脂質異常症、冠動脈心疾患、脳卒中など）に対する原爆放射線被曝の遺伝的影響について解析を行った。しかし、被爆二世集団の年齢が若く（当時の平均年齢は約49歳）、疾患の好発年齢に達していなかったため、前向き追跡調査を行うコホートに転換させ、2010年11月に4年を1周期とした健診を開始した。

2014年には、東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究（原発緊急作業従事者に対する研究：NEWS）が開始した。2015年にNEWS担当部署が広島臨床研究部内に設置された。AHSやF1臨床調査の健診プログラムで培われた経験がNEWSの縦断的健康調査に活用されている。

2017 年度業績

放射線とがん

感染性因子やホルモンまたは生活習慣関連因子などのリスク因子がそれぞれ放射線リスクを修飾するかどうかを調べるために AHS 対象者の保存血清や血球を使う 3 つのコホート内症例対照研究を実施した。当部は、研究代表者として胃がんおよび肝がんについて、共同研究者として乳がんについて研究した。

[胃がん研究]

- 病理型別胃がんリスクに対する慢性胃炎と放射線の同時効果について再解析を継続した。その結果、放射線被曝が慢性萎縮性胃炎を伴わないびまん型非噴門部胃がんのリスク増加と関連していることが示唆された。

[肝がん研究]

- B 型肝炎ウイルス (HBV) と C 型肝炎ウイルス (HCV) の感染および放射線被曝がそれぞれ独立して肝細胞がん (HCC) のリスク増加と関連していること、放射線被曝がアルコール摂取、喫煙や BMI と明らかに交絡せずに非 B 非 C 型 HCC の有意なリスク因子であること、が最近の放影研の調査結果により示された。放射線被曝に起因する慢性炎症が、HBV/HCV 感染や生活習慣関連因子に関係なく、インスリン抵抗性や肝線維化を介して HCC の発症に関与しているかどうかを調べることを目的に調査を実施している。統計部および疫学部と共同で、バイオマーカー値を基に潜在因子 (炎症、インスリン抵抗性、肝線維化など) を推測する統計モデルの構築に取り組んだ。
- がんリサーチクラスターにおいて、統計部、分子生物科学部および疫学部の研究員が放射線と肝がんに関する学際的なプログラムプロジェクト (HBV/HCV 関連 HCC の放射線リスクの機序に関係するプロジェクト、放射線に関連する非 B 非 C 型 HCC の機序に関係するプロジェクト、影響修飾を含む生活習慣因子と放射線の同時効果に関係するプロジェクト、方法論に関係するプロジェクト) を提案した。全体的な目標は、1) 原因となる生物学的・臨床的側面の理解を深めるため、2) リスク推定値の精度を高めるため、3) 放射線に関連する HCC に原因確率を割り当てることができるようにするため、HCC の放射線リスクの機序を解明し定量化することである。

[骨髄異形成症候群 (MDS) の発症機序]

- 放射線は造血器悪性腫瘍の発症原因の一つである。被曝後 50 年が経過しても、原爆被爆者では急性骨髄性白血病 (AML) や MDS などの造血器悪性腫瘍のリスクが高い。このような疾患について最近実施されたゲノム解析から、ほとんどの試料には幾つかの遺伝子突然変異が含まれていることが示された。MDS が臨床診断される前の突然変異クローンを特定し、それが被曝放射線量によっていかに変動するかを調べることを目的とする。MDS を発症した AHS 対象者の突然変異を次世代ゲノム解析技術を使って検出することを計画している。本調査は、放射線誘発骨髄系造血器腫瘍がいかに発症するかという非常に重要な課題に対する答えを

出すであろう。さらに、放射線による骨髄系造血器腫瘍の発症機序に関する新たな知見を得ることができるであろう。

放射線と非がん疾患:白内障

後囊下混濁への放射線影響に関しては、原爆被爆者およびその他の被曝集団において十分に裏付けされている。しかし皮質混濁および核混濁への放射線影響については、証拠は不十分であり研究結果に一貫性がない。そのため新たな眼科調査を実施し、標準化された方法に基づき細隙灯顕微鏡、徹照カメラ、シャインプルーフカメラの3つの装置による水晶体画像を収集している。

- 2016年4月に、広島大学および長崎大学の眼科医と協力し白内障調査のため上記装置を使った眼科検査を広島と長崎で開始した。本調査は白内障専門家による指導を受け、当該専門家が撮影画像に基づき白内障の重症度も判定する。約600人の対象者が眼科医による検査を受け、水晶体画像が得られた。

放射線と非がん疾患:心血管疾患(CVD)

1960年代以降、ホジキンリンパ腫のマントル放射線治療中に使用された程度の相当量の放射線量(>30 Gy)は心臓を傷害する可能性が認識されてきた。低線量放射線に関し、微小血管系への影響、酸化、炎症および突然変異説など低線量被曝に適用可能な理論がいくつか存在するが、疫学的データは不十分であり生物学的に説得力のある機序は見つかっていない。LSS および AHS のこれまでの調査結果は、放射線被曝と心血管疾患の死亡や罹患との間に関連があることを示唆しているが、多様な亜型と心血管疾患リスクに関連する交絡リスク因子が放射線影響の推定を複雑にしている。動脈硬化、心疾患、慢性腎臓病および心房細動と放射線被曝との関係を詳細に検討することを目的とする調査を実施している。

- LSS 調査や文献で紹介されている放射線以外の調査によって、心血管疾患の死亡や罹患について低・中線量の放射線リスクが最近確認されているが、病因・発症経路について十分な特徴付けはされていない。これら経路をさらに明らかにするためにAHSにおいて、動脈硬化の生理学的な指標および潜在的な関連バイオマーカーと放射線量について調べている。脈波伝播速度、脈波増大係数、足関節上腕血圧比(ABI)、頸動脈内中膜壁厚、胸腹部大動脈の大動脈石灰化を動脈硬化の指標として測定した。放射線で誘発されたアテローム発生との関係が考えられる多機能サイトカインも測定した。現在、これら指標とバイオマーカーに係る複雑な経路を構造方程式モデルにより評価しているところである。この調査では、AHSにおいてABIに基づき診断された末梢動脈疾患の有病率と放射線被曝との間に明らかな関連は見られなかった。
- LSS や他の調査が、虚血性心疾患に加え、心不全や弁膜症が放射線被曝に関連していることを示唆している。約2,700人のAHS対象者について、これら疾患のリスクを決定し、これらのタイプの疾患の早期指標を得るために、心エコーおよび関連するバイオマーカーを用いた調査を実施した。

- 放射線量と慢性腎臓病およびアルブミン尿との関連について解析を継続した。
- 心房細動と放射線線量との関連を引き続き解析した。
- 放射線に関連した心血管疾患については、これまでの AHS の所見では一貫して心筋梗塞に対する線量影響(特に女性と高線量群)が示唆されている。特に 1968 年から 1998 年の AHS 調査において、40 歳前に被曝した人の中で非致死性の心筋梗塞について二次線量反応が見られ、主に高線量においてリスクを示した。最近の LSS 調査でも、高血圧性心疾患、リウマチ性心疾患、心臓弁膜症、心不全による死亡と放射線被曝の間に統計的に有意な関連が見られたが、心筋梗塞を含む虚血性心疾患では見られなかった。心血管疾患死亡の調査は、死亡診断書に記載された診断に関する不確実性を伴う。放射線被曝と心血管疾患罹患との関係を究明するため、1958 年から 2011 年までの AHS のカルテを一貫した診断基準に基づき調べ心血管疾患症例を検出した。

放射線と非がん疾患:その他

非がん疾患と低・中線量被曝が関連している可能性に焦点を当てた他の研究も実施している。LSS データは、循環器疾患や消化器疾患などの非がん疾患による死亡リスクが放射線に関連して増加することを示唆した。AHS データも、糖尿病、甲状腺疾患、慢性肝疾患などの非がん疾患の罹患リスクが放射線の影響によって増加(または、正の線量反応)を示すことを示唆した。このような非がん疾患が放射線被曝と関連しているか否かを究明するために、非がん疾患あるいは病態に関する線量反応関係について検討し、探求的なアプローチによって起こり得る機序を特定する。これらの調査は、臨床・疫学データと縦断的に収集保存されている試料に基づき非がんリサーチクラスター内で策定される。

- ABCC と放影研は、AHS 参加者の糖尿病と放射線との関係について、線量反応に関する研究を複数実施してきたが、その所見は一貫性に欠ける。放射線被曝が広島と長崎の糖尿病発生に関係しているか否かを特定し、そのような関係があるとすれば、それは広島・長崎間で、または被曝時年齢によって異なるのか否かを調べるために、1958 年に設定された最初の AHS 集団 12,759 人の対象者のカルテを標準化された基準に基づき再検討した。2017 年 12 月現在で 1,863 例の糖尿病症例を検出した。カルテの再検討は現在も進行中である。
- 甲状腺機能異常または自己免疫と低・中線量の放射線との関係を調べた(J Clin Endocrinol Metab 2017;102:2516-24)。
- LSS および AHS データにより、慢性肝疾患および肝硬変は放射線量に関連することが示された。B 型または C 型慢性肝疾患および非アルコール性脂肪性肝炎に罹患した人では、慢性肝疾患から肝硬変や HCC に進行する場合がある。原爆放射線が肝弾性度(肝線維化の程度を示す指標)を増大させるのかを究明するために、そして肝線維化がインスリン抵抗性を誘発することにより動脈硬化性疾患の発症に関与しているのかを調べるために、エラストメーターを用いた肝弾性度の測定値とそれ以外の血中線維化マーカーの関連を調べた。今後の研究にお

いて、放射線がそのような影響を増大させるか否かについて調べる予定である。

- AHS やいくつかの小児期放射線治療に関する研究は、胎内期および幼少期において脳は放射線による損傷を受けやすいことを示している。ABCC / 放影研などによる研究は、胎内被曝および幼少期被曝と若年期の認知障害との関係を示している。被曝後 65 年以上を経て見られる認知機能に対する放射線の被曝影響を調べるために、主観的な神経認知機能を評価する自記式の神経認知能問診票 (NCQ) に基づく調査を被曝時年齢が 13 歳未満の被曝者を対象に実施した。バックグラウンド解析における非被曝者の主観的な神経認知機能に対する人口統計学因子の影響を解析した結果は、年齢が高いほど、また学歴が低いほど、主観的な神経認知機能に関する症状の頻度が高いことを示した。

遺伝的影響

縦断的 F₁ 臨床集団について 2002 年から 2006 年までに実施された第 1 回目の健診 (第 1 サイクル目の健診) では、親の放射線被曝に起因した成人発症多因子疾患の有病率が増加することを示す証拠は見られなかったが、調査集団の年齢はまだ若かった。多くの多因子疾患が発症する高齢期に達するまで対象者を追跡し質の高い臨床研究を継続しなければ、ヒトに関する最も信頼できるデータを得ることはできない。本調査の目的は、F₁ 対象者に発症する多遺伝子性、多因子疾患および発症前の臨床徴候に対する親の原爆放射線被曝の影響を解明することである。また、前向き縦断的データが得られれば疾患の罹患率を推定することができるので、そのようなデータが得られた場合に、自己選択バイアスを最小限に抑えられる傾向がある。これまでに以下を実施した。

- 2010 年 11 月に 4 年を 1 サイクルとする縦断的な被曝二世臨床調査 (FOCS) を開始し、2 サイクル目の健診を終了した。10,426 人が受診し、当該サイクルの受診率は 79.6% であった。3 サイクル目の健診を実施中である。
- 2010 年 11 月から 2015 年 10 月の期間に調査に参加した約 10,000 人の FOCS 対象者における多因子疾患について、疾患別の有病率と罹患率の予備集計をした。
- 疫学部、分子生物学部および統計部と共同で統合プログラムプロジェクトを策定する取り組みを始めた。

東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究 (NEWS)

東電福島第一原発事故の後、緊急作業従事者の被曝線量限度が通常の 100 mSv から 250 mSv まで引き上げられた 2011 年 3 月 14 日から 12 月 16 日まで緊急作業に従事した約 2 万人の緊急作業従事者を対象とする研究である。本研究の目的は、放射線による緊急作業従事者の長期健康影響を明らかにすることである。本プロジェクトは、死因・がん罹患調査、臨床調査、甲状腺がん・白内障・心理的影響に関する特別臨床調査、および放射線生物学研究などで構成されている。2017 年度は、引き続き研究計画の策定、集団の設定、および研究対象者の募集を行った。これまでに以下を実施した。

- 受診が見込まれる合計約 6,700 人の対象者が調査に参加することに同意しており、2017 年 11 月時点で合計約 3,900 人の対象者が一般健診を受診した。
- 甲状腺がんおよび心理的影響に関する調査も、協力医療機関において一般健診と同時に実施された。白内障調査は、2018 年に日本白内障学会および日本眼科学会の協力を得て開始する。
- 死因調査については、2017 年 10 月に電子化された人口動態統計データの使用許可を厚生労働省から得た。
- 個人放射線量の再構築の継続: 厚労省から提供された暫定的な線量に加え、2017 年 9 月に緊急作業に係る企業記録を入手した。